

TABAQUISMO *(método para dejar el hábito)*

EDITORIAL

El tabaco planta originaria de América, antiguamente era utilizada con finalidades curativas y ceremoniales.

Se denomina tabaquismo al consumo habitual del tabaco, en cualquiera de sus modalidades: fumado, inhalado o masticado. El tabaquismo es considerado un serio problema de salud. El consumo de tabaco es la causa más importante de enfermedad y de mortalidad prevenible en el mundo.

Actualmente existen unos 1.300 millones de fumadores en todo el mundo. El número de muertes por consumo de tabaco es de 4,9 millones de personas por año. Si continúan los actuales patrones de consumo, el número de defunciones aumentará a 10 millones para el año 2020 y un 70% de las muertes ocurrirá en los países en

desarrollo. Se hace necesario tomar medidas desde ahora para evitar que esto suceda, los gobiernos y los legisladores deben desempeñar su papel aunque no deben ser los únicos, la sociedad en general también debe participar en la lucha contra el tabaquismo.

A medida que las investigaciones y los resultados siguen revelando los efectos perjudiciales del consumo de tabaco sobre la salud y aumenta el número de personas afectadas, la lista de afecciones causadas por el consumo de tabaco ha crecido, ahora también se incluyen: cataratas, neumonía, leucemia mieloide aguda, aneurisma aórtico abdominal, cáncer del estómago, cáncer pancreático, cáncer cervicouterino, cáncer renal, periodontitis y otras enfermedades.

Estas enfermedades se unen a la lista de padecimientos relacionados con el tabaco como el cáncer de vesícula, pulmón, esófago, laringe, boca y garganta, enfermedades pulmonares y cardio-

vasculares crónicas y daños al sistema reproductivo.

Sin embargo, los que consumen tabaco no son los únicos expuestos a sus efectos nocivos, millones de personas, incluida la mitad de los niños del mundo, están expuestos al humo de tabaco ajeno, conocido también como tabaquismo pasivo. Hay pruebas definitivas que vinculan el tabaquismo pasivo a un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias en los adultos y enfermedades respiratorias, infecciones del oído y síndrome de muerte súbita del lactante en los niños, por mencionar algunos de sus efectos perjudiciales.

Se trata de un problema de salud que exige el esfuerzo activo de toda la sociedad.

Además de las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco y las causadas por la exposición pasiva al humo de tabaco ajeno, la dependencia del tabaco es también una enfermedad

según se describe en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Por ser una enfermedad crónica, que a menudo conlleva recaídas, la adicción a la nicotina requiere un tratamiento adecuado.

A pesar de lo que se conoce hoy acerca del tabaco, el consumo sigue aumentando en todo el mundo. La epidemia sigue en expansión, especialmente en los países menos desarrollados.

La industria tabacalera tiene un mercado potencial enorme en estos países, donde se enfrenta con medidas de control más débiles y encuentra un gran número de nuevos

posibles clientes, sobre todo entre las mujeres. En los últimos años la epidemia del tabaco se ha extendido entre las mujeres. Datos recientes de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes indican que el consumo de tabaco entre las niñas está aumentando considerablemente en todo el mundo y esta prevalencia es en muchos casos, equiparable o incluso mayor que en los niños.

Algunos datos sobre el tabaco

1. El tabaco causa alrededor de 13 500 defunciones por día
2. La mitad de los niños están expuestos al humo del tabaco en la propia vivienda
3. El 47,5% de los hombres fuman
4. El 10,3% de las mujeres fuman
5. El tabaco causa graves problemas de salud
6. El cigarrillo es el único producto de consumo legalmente disponible que mata a quien lo consume normalmente

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo cobra una vida cada 8 segundos. Las investigaciones realizadas llevan a pensar que las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia (como ocurre en más del 70% de los casos) y siguen haciéndolo durante 20 años o

más, vivirán entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan probado el tabaco. El cáncer de pulmón y las cardiopatías no son los únicos causantes de serios problemas de salud y de defunciones. A continuación se describen algunos efectos secundarios menos conocidos del tabaco, cuyo consumo nos afecta de la cabeza a los pies:

- Caída del cabello, Catarata, Arrugas, Pérdida de oído, Deterioro de la dentadura, Enfisema, Osteoporosis, Cardiopatías, Úlcera gástrica, Discromía de los dedos, Cáncer de útero y aborto espontáneo, Deformación de espermatozoides, Enfermedad de Buerger, y Cáncer

El humo de tabaco de segunda mano es una amenaza real y considerable para la salud pública. Los niños corren riesgos particulares; la exposición de los niños al humo de tabaco puede causar afecciones respiratorias, enfermedades del oído medio, ataques de asma y síndrome de muerte súbita del recién nacido (SMSRN).

Entre las acciones de la OMS está el Tratado Internacional para el Control del Tabaco y el **Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:**

Fumar se encuentra arraigado en las costumbres y cultura de los pueblos. Cuba se considera un país de fumadores, la calidad del

DIRECTORA

Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Aurea Ramos Boch

CONFECCIÓN Y DISEÑO

Mercedes Martínez Martos

Publicación mensual, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio Web por la Red Telemática de Salud.

©1994-2007

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mpobeá@infomed.sld.cu

tabaco cubano se reconoce en el mundo entero, quizás por ello son muchas las personas que fuman y las que no lo hacen generalmente se ven afectadas por la presencia del fumador y su dañino proceder.

Entre el 33 y el 38% de los cubanos mayores de 16 años fuma. Cuba se encuentra entre los países de América Latina y el Caribe con más alto consumo de cigarrillos, conjuntamente con Argentina, Brasil y Chile.

Dentro de las acciones para esta epidemia el Ministerio de Salud Pública de Cuba, cuenta con el Programa para la Prevención y el Control del Tabaquismo.

Cada **31 de mayo**, el mundo celebra el **Día Mundial sin Tabaco (DMST)**. Esta celebración fue creada por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en 1987 para acentuar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo, así como para reducir las muertes prevenibles, y las enfermedades causadas por el uso del tabaco.

Tèc. Aurea Ramos Boch

Referencias Bibliográficas:

1. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Programa para la Prevención y el Control del Tabaquismo en Cuba. Disponible en:

<http://aps.sld.cu/bvs/materiales/programa/otros/pptc.pdf>

2. Galdo Fernández A. EL humo del tabaco perjudica a todos. Disponible en:

<http://www.sld.cu/saludvida/adicciones/temas.php?idv=10528>

3. Millares G. Los números dicen de tabaquismo. Disponible en:

<http://www.sld.cu/saludvida/temas.php?idv=9732>

4. Organización Mundial de la Salud (OMS): Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Disponible en:

http://www.who.int/tobacco/framework/fctc_es.pdf

5. Organización Mundial de la Salud (OMS): Día Mundial Sin Tabaco (DMST). Disponible en:

<http://www.paho.org/spanish/ad/sde/ra/Tabdmst.htm>

6. Organización Mundial de la Salud (OMS): La función de los profesionales de la salud en el control del tabaco. Disponible en:

<http://www.paho.org/Sp/panish/AD/SDE/RA/control-tobacco3.pdf>

7. Organización Mundial de la Salud (OMS): Un tratado internacional

para el control del tabaco. Disponible en: <http://www.who.int/features/2003/08/es/>

TABAQUISMO/ prevención y control

Achiong Estupiñán F, Morales Rigau JM, Dueñas Herrera A, Acebo Figueroa F, Bermúdez González CL, Garrote Rodríguez I. Prevalencia y riesgo atribuible al tabaquismo. Rev Cuba Hig Epidemiol [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];44(1):[Aprox. 18p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032006000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es

American Academy of Family Physicians. Information from your family doctor. Tips to help you quit smoking. Am Fam Physician [Serie en Internet] 2006 [citado 13 de Mar 2007]; 74(2):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/20060715/276ph.html>

Berdasquera Corcho D, González González O, Suárez Larreinaga CL, Gala González A, Oropesa González L. Hábito de fumar en trabajadores de la salud después de una estrategia de intervención. Rev cuba med gen integr [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007]; 21(3-4):[Aprox. 19 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252005000300008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Brown CS, Rudkjobing A. Smoke-free medical students' meetings. Lancet. 2005; 366(9489):893-4.

Ejemplar localizado en: BMN, IMT-PK

Calvete Oliva A. Actividad de la unión europea en materia de lucha contra el tabaquismo. Rev Esp Salud Publica [Serie en Internet] 2005 [citado 14 Mar 2007];7(5):[Aprox. 21 p]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000500002&lng=es&nrm=iso

Camarelles-Guillem F. [Family doctors and semFYC faced with tobacco dependency]. Aten Primaria [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];37(8):[Aprox. 7p.]. Disponible en: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZI0105&rev=27&vol=37&num=8&pag=427

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Estimated exposure of adolescents to state-funded anti-tobacco television advertisements--37 states and the District of Columbia, 1999-2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005; 54(42):1077-80.

Ejemplar localizado en: CPICM-CF

Coleman T, Thornton J, Britton J, Lewis S, Watts K, Coughtrie MW, et al. Protocol for the smoking, nicotine and pregnancy (SNAP) trial: double-blind, placebo-randomised, controlled trial of nicotine replacement therapy in pregnancy. BMC Health Serv Res [Serie en Internet]. 2007 [citado 13 Mar 2007];7:[Aprox. 49 p]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17201904>

Córdoba R, Villalba J R, Salvador-Llivina T, López-García Aranda V. El proceso en España de la adopción de una legislación

eficaz para la prevención del tabaquismo. Rev Esp Salud Publica [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];80(6): [Aprox. 35 p]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000600004&lng=es&nrm=iso

Curry SJ, Mermelstein RJ. Do as I say, not as I do: does it work for tobacco use prevention?. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160(1):102-3.

Ejemplar localizado en: BMN

Cheng MH. Judith Mackay. Lancet. 2006;367(9526):1895.

Ejemplar localizado en: BMN

González M, Malcoe LH, Kegler MC, Espinoza J. Prevalence and predictors of home and automobile smoking bans and child environmental tobacco smoke exposure: a cross-sectional study of U.S.- and Mexico-born Hispanic women with young children. BMC Public Health [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];6:[Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17069652>

Granero R, Sánchez M. Cambios en el uso de tabaco y factores relacionados en estudiantes del sexto al noveno grado, Estado Lara, Venezuela, años 2000 y 2003. Cad Saúde Pública [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];22(9):[Aprox. 17p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2006000900020&lng=es&nrm=iso

Fiore MC, Keller PA, Baker TB. The Justice Department's case

against the tobacco companies. N Engl J Med. 2005;353(10): 972-5.

Ejemplar localizado en: BMN, IMT-PK

Hudmon KS, Hussar DA, Fenlon CM, Corelli RL. Pharmacy students' perceptions of tobacco sales in pharmacies and suggested strategies for promoting tobacco-free experiential sites. Am J Pharm Educ [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];70(4): [Aprox. 11 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17136194>

Jackson C, Dickinson D. Enabling parents who smoke to prevent their children from initiating smoking: results from a 3-year intervention evaluation. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160(1):56-62.

Ejemplar localizado en: BMN

Jamrozik K. The epidemiology of colonialism. Lancet. 2006; 368(9529):4-6.

Ejemplar localizado en: BMN

Jones AS, Austin WD, Beach RH, Altman DG. Funding of North Carolina tobacco control programs through the Master Settlement Agreement. Am J Public Health. 2007;97(1):36-44.

Ejemplar localizado en: BMN

The long and winding road towards a tobacco-free world. Lancet. 2005;366(9497):1586.

Ejemplar localizado en: BMN, IMT-PK

Martínez-Donate AP, Hovell MF, Hofstetter CR, González-Pérez GJ, Adams MA, Sánchez Jde J, et al. Smoking, exposure to

secondhand smoke, and smoking restrictions in Tijuana, Mexico. *Rev Panam Salud Publica*. 2005;18(6):412-7.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-C, CPICM-CF, CPICM-G, CPICM-H, CPICM-VC, POR-GT

NIH State-of-the-Science Panel. National Institutes of Health State-of-the-Science conference statement: tobacco use: prevention, cessation, and control. *Ann Intern Med*. 2006; 145(11):839-44.

Ejemplar localizado en: BMN

Okuyemi KS, Nollen NL, Ahluwalia JS. Interventions to facilitate smoking cessation. *Am Fam Physician* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007]; 74(2):[Aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/2006/0715/262.html>

Pbert L. Nurse-conducted smoking cessation in patients with COPD, using nicotine sublingual tablets and behavioral support. *Chest*. 2006;130(2): 314-6.

Ejemplar localizado en: BMN

Puschel K, Thompson B, Coronado G, Rivera S, Díaz D, González L, et al. Tabaquismo en Atención Primaria: Perfil de fumadoras consultantes, creencias y actitudes de los equipos de salud y oportunidades de intervención. *Rev méd Chile* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];134(6):[Aprox. 28 p.]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872006000600008&lng=es&nrm=iso

Ranney L, Melvin C, Lux L, McClain E, Lohr KN.

Systematic review: smoking cessation intervention strategies for adults and adults in special populations. *Ann Intern Med*. 2006;145(11):845-56.

Ejemplar localizado en: BMN

Reducing the burden of stroke. *Lancet*. 2005;366(9499):1752.

Ejemplar localizado en: BMN, IMT-PK

Saloojee Y. Cochrane column: commentary: interventions for preventing tobacco sales to minors. *Int J Epidemiol*. 2006; 35(1):32-3.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Saltó E, Villalbí JR, Valverde A, Baranda L, Plasencia A. Políticas reguladoras y opinión pública: El caso del tabaco. *Rev Esp Salud Publica* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];80(3):[Aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272006000300004&lng=es&nrm=iso

Stanton H. Bring tobacco and alcohol control to the fore to achieve the health MDGs. *Bull World Health Organ*. 2005; 83(10):799.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-VC, FCM-SA, HPSIQ-H

Suárez Lugo N. El consumo de productos manufacturados del tabaco en Cuba. *Rev Cuba Salud Pública* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];32(2):[Aprox. 13 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Tobacco Convention: countries "changed history". *Bull World Health Organ*. 2006;84(3):172.

Ejemplar localizado en: BMN, CPICM-VC

Tobacco convention needs signatories' full support. *Lancet*. 2006; 367(9510):542.

Ejemplar localizado en: BMN

Travis K. China ratifies international tobacco treaty. *J Natl Cancer Inst*. 2005;97(19): 1404.

Ejemplar localizado en: INOR

Vidrine DJ, Arduino RC, Lazev AB, Gritz ER. A randomized trial of a proactive cellular telephone intervention for smokers living with HIV/AIDS. *AIDS*. 2006;20(2): 253-60.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Villalbí JR. De las propuestas del movimiento de prevención al consenso político: la ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo. *Gac Sanit* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];20(1):[Aprox. 11 p.]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112006000100001&lng=es&nrm=iso

Wakefield M, Terry-McElrath Y, Emery S, Saffer H, Chaloupka FJ, Szczycka G, et al. Effect of televised, tobacco company-funded smoking prevention advertising on youth smoking-related beliefs, intentions, and behavior. *Am J Public Health*. 2006;96(12):2154-60.

Ejemplar localizado en: BMN

Yach D. Cochrane column: commentary: interventions for

preventing tobacco sales to minors. *Int J Epidemiol.* 2006; 35(1):32.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

TABAQUISMO/terapia

Barzani D. Iraq: an important start in the Kurdish region. *Tob Control* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 mar 2007]; 15(1):[Aprox. 7 p.]. Disponible en:

<http://tc.bmj.com/cgi/content/full/15/1/3>

Carvajal Chavez LM, Andrade D. [Basic education in the prevention of alcohol consumption and smoking: a reality report]. *Rev Lat Am Enfermagem* [Serie en Internet] 2005 [citado 13 Mar 2007];13: [Aprox. 19 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000700004&tlng=es&lng=en&nrm=iso

Erbas B, Bui Q, Huggins R, Harper T, White V. Investigating the relation between placement of Quit antismoking advertisements and number of telephone calls to Quitline: a semiparametric modelling approach. *J Epidemiol Community Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 mar 2007];60(2):[Aprox.15 p.]. Disponible en: <http://jech.bmj.com/cgi/content/full/60/2/180>

Franken FH, Pickworth WB, Epstein DH, Moolchan ET. Smoking rates and topography predict adolescent smoking cessation following treatment with nicotine replacement therapy. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];15(1):[Aprox. 16 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=Abstr>

[actPlus-def&PrId=3051&uid=16436403&db=pubmed&url=http://ceb.p.aacrjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436403](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=Abstr&db=pubmed&url=http://tc.bmjournals.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436406)

The FDA approves new drug for smoking cessation. *FDA Consum* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007]; 40(4):[Aprox. 3 p.]. Disponible en:

http://www.fda.gov/fdac/features/2006/406_smoking.html

Garg RK, Tandon S. Smoking habits of adolescents and the role of dentists. *J Contemp Dent Pract* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 May 2007]; 7(2):[Aprox. 20 p.]. Disponible en:

http://www.thejcdp.com/issue026/pdfs_web/garg.pdf

Hamann S. Thailand: mass exercise, petition, and lure-free points of sale. *Tob Control* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 mar 2007];15(1):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://tc.bmj.com/cgi/content/full/15/1/5>

Hu S, Pallonen U, McAlister AL, Howard B, Kaminski R, et al. Knowing how to help tobacco users. Dentists' familiarity and compliance with the clinical practice guideline. *J Am Dent Assoc* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];137(2): [Aprox. 34 p.]. Disponible en: <http://jada.ada.org/cgi/content/full/137/2/170>

Ibrahim JK, Glantz SA. Tobacco industry litigation strategies to oppose tobacco control media campaigns. *Tob Control* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];15(1):[Aprox. 42 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=Abstr&db=pubmed&url=http://tc.bmjournals.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436406>

[6&db=pubmed&url=http://tc.bmjournals.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436406](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=Abstr&db=pubmed&url=http://tc.bmjournals.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436406)

Jiménez Ruiz CA. [Nicotine replacement therapy during pregnancy]. *Arch Bronconeumol* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];42(8): [Aprox. 8 p.]. Disponible en: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevisa.pubmed_full?inctrl=05ZI0104&rev=6&vol=42&num=8&pag=404

Jones AS, Austin WD, Beach RH, Altman DG. Funding of North Carolina tobacco control programs through the Master Settlement Agreement. *Am J Public Health.* 2007;97(1):36-44.

Ejemplar localizado en: BMN

Kipping RR, Martin J, Barnes L. UK experience of smoke-free young offenders institute. *BMJ* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 mar 2007];332(7533): [Aprox 4 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=Abstr&db=pubmed&url=http://bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16410602>

Leavell NR, Muggli ME, Hurt RD, Repace J. Blowing smoke: British American Tobacco's air filtration scheme. *BMJ* [Serie en Internet]. 2006 [citado 13 Mar 2007];332(7535):[Aprox. 17 p.]. Disponible en: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/332/7535/227>

Poland B, Frohlich K, Haines RJ, Mykhalovskiy E, Rock M, Sparks R. The social context of smoking: the next frontier in tobacco control?. *Tob Control* [Serie en Internet] 2006 [citado 13 Mar 2007];15(1):[Aprox. 22 p.]. Disponible en:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=3051&uid=16436407&db=pubmed&url=http://tc.bmjournals.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16436407>

Ranney L, Melvin C, Lux L, McClain E, Lohr KN. Systematic review: smoking cessation intervention strategies for adults and adults in special populations. *Ann Intern Med.* 2006;145(11):845-56.

Ejemplar localizado en: BMN

Roll JM. Assessing the feasibility of using contingency management to modify cigarette smoking by adolescents. *J Appl Behav Anal [Serie en Internet]* 2005 [citado 13 Mar 2007]; 38(4):[Aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16463527>

Sala M, Serra I, Serrano S, Corbella T, Kogevinas M. Evaluación de un programa de deshabituación tabáquica en el medio laboral. *Gac Sanit [Serie en Internet]* 2005 [citado 14 Mar 2007];19(5):[Aprox. 21 p.]. Disponible en: http://www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112005000500007&lng=es&nrm=iso

Saloojee Y. Cochrane column: commentary: interventions for preventing tobacco sales to minors. *Int J Epidemiol.* 2006; 35(1):32-3.

Ejemplar localizado en: IMT-PK

Simpson D. Hong Kong, China: Marlboro pack sleeves. *Tob Control [Serie en Internet]* 2006 [citado 13 Mar 2007]; 15(1):[Aprox. 11 p.]. Disponible en:

<http://tc.bmj.com/cgi/content/full/15/1/6>

West R, Sohal T. "Catastrophic" pathways to smoking cessation: findings from national survey. *BMJ [Serie en Internet]* 2006 [citado 13 Mar 2007];332(7539):[Aprox. 11 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16443610>

CESE DEL USO DE TABACO/métodos

Balbani AP, Montovani JC. Methods for smoking cessation and treatment of nicotine dependence. *Rev Bras Otorrinolaringol (Engl Ed) [Serie en Internet]*. 2005 [citado 14 mar 2007];71(6): [Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72992005000600021&tlng=en&lng=en&nrm=iso

Bars MP, Banauch GI, Appel D, Andreachi M, Mouren P, Kelly KJ, et al. "Tobacco Free With FDNY": the New York City Fire Department World Trade Center Tobacco Cessation Study. *Chest.* 2006;129(4): 979-87.

Ejemplar localizado en: BMN

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of cessation methods among smokers aged 16-24 years--United States, 2003. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Serie en Internet]* 2006 [citado 14 Mar 2007];55(50):[Aprox. 9p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=4503&uid=17183227&db=pubmed&url=http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5550a3.htm>

Cobb NK, Graham AL. Characterizing Internet searchers of smoking cessation information. *J Med Internet Res [Serie en Internet]* 2006 [citado 14 Mar 2007];8(3):[Aprox. 39 p.]. Disponible en: <http://www.jmir.org/2006/3/e17/>

Cunningham JA. Barriers to tobacco cessation. *CMAJ [Serie en Internet]* 2006 [citado 14 Mar 2007];175(4):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/175/4/388>

Dervaux A, Kanit M, Laqueille X. Efficacy of varenicline for smoking cessation. *JAMA.* 2006;296(21):2555

Ejemplar localizado en: BMN

Cunningham JA. Barriers to tobacco cessation. *CMAJ [Serie en Internet]* 2006 [citado 14 Mar 2007];175(4):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/175/4/388>

Dervaux A, Kanit M, Laqueille X. Efficacy of varenicline for smoking cessation. *JAMA.* 2006;296(21):2555

Ejemplar localizado en: BMN

Gonzales D, Rennard SI, Nides M, Oncken C, Azoulay S, Billing CB, et al. Varenicline Phase 3 Study Group. Varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. *JAMA.* 2006; 296(1):47-55.

Ejemplar localizado en: BMN

de Granda JJ, Carrion F, Alonso S, Márquez FL, Riesco JA, Sampablo I, et al Área de

Tabaquismo de la SEPAR. [Tobacco addiction: care and services]. Arch Bronconeumol [Serie en Internet] 2006 [citado 14 mar 2007];42(11):[Aprox. 16 p.]. Disponible en: <http://www.archbronconeumol.org/cgi-bin/wdbcgi.exe/abn/abneng.mrevista.fulltext?pid=13095805>

Gutz S, Gillissen A. [Prevention of lung cancer]. MMW Fortschr Med. 2006;148(22):26-7.

Ejemplar localizado en: BMN

Havlicek D, Stafne E, Pronk NP. Tobacco cessation interventions in dental networks: a practice-based evaluation of the impact of education on provider knowledge, referrals, and pharmacotherapy use. Prev Chronic Dis [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007]; 3(3):[Aprox. 20 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16776897>

Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, Azoulay S, Watsky EJ, Williams KE, et al. Varenicline Phase 3 Study Group. Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296(1):56-63.

Ejemplar localizado en: BMN

Lee HS, Seo JC, Ha ID. Acupuncture for smoking cessation?: commentary. Yonsei Med J [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];47(1):[Aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://www.eymj.org/2006/pdf/02155.PDF>

López Lázaro L. [Commentary: Interventions for smoking cessation: hopes and methodology problems]. Aten Primaria [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007]; 37(9):[Aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstrActPlus-def&PrId=3145&uid=16756870&db=pubmed&url=http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZIO105&rev=27&vol=37&num=9&pag=482

McNeil C. Nicotine vaccines move toward pivotal trials. J Natl Cancer Inst [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007]; 98(5):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://jnci.oxfordjournals.org/misc/terms.shtml>

Munafò MR, Johnstone EC, Wileyto EP, Shields PG, Elliot KM, Lerman C. Lack of association of 5-HTTLPR genotype with smoking cessation in a nicotine replacement therapy randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev [Serie en Internet] 2006 [citado 14 mar 2007];15(2): [Aprox. 11 p.]. Disponible en: <http://cebp.aacrjournals.org/cgi/content/full/15/2/398>

Otero UB, Pérez Cde A, Szklo M, Esteves GA, dePinho MM, Szklo AS, et al. [Randomized clinical trial: effectiveness of the cognitive-behavioral approach and the use of nicotine replacement transdermal patches for smoking cessation among adults in Rio de Janeiro, Brazil]. Cad Saude Publica [Serie en Internet] 2006 [citado 4 Mar 2007];22(2): [Aprox. 24 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102

=

[311X2006000200021&tlng=es&lng=en&nrm=iso](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstrActPlus-def&PrId=311X2006000200021&tlng=es&lng=en&nrm=iso)

Sachs DP. Tobacco dependence treatment: time to change the paradigm. Chest. 2006;129(4): 836-9.

Ejemplar localizado en: BMN

Shelley D, Fahs MC, Yerneni R, Qu J, Burton D. Correlates of household smoking bans among Chinese Americans. Nicotine Tob Res [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];8(1):[Aprox. 27 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstrActPlus-def&PrId=3494&uid=16497604&db=pubmed&url=http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16497604>

Schroeder SA, Sox HC. Trials that matter: varenicline: a designer drug to help smokers quit. Ann Intern Med. 2006;145(10):784-5.

Ejemplar localizado en: BMN

Sneden GG, Gottlieb-Nudd AS, Gottlieb NH, Huang PP. A feedback model for applied research on tobacco control. Prev Chronic Dis [Serie en Internet] 2006 [citado 14 mar 2007];3(2):[Aprox. 18 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16539806>

Tanaka H, Yamato H, Tanaka T, Kadowaki T, Okamura T, Nakamura M, et al. HIPOP-OHP research group. Effectiveness of a low-intensity intra-worksite intervention on smoking cessation in Japanese employees: a three-year intervention trial. J Occup Health [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];48(3):

[Aprox. 3 p.]. Disponible en: http://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/48/3/48_175/article

Tonnesen P, Mikkelsen K, Bremann L. Nurse-conducted smoking cessation in patients with COPD using nicotine sublingual tablets and behavioral support. *Chest*. 2006;130(2):334-42.

Ejemplar localizado en: BMN

Wetter DW, Mazas C, Daza P, Nguyen L, Fouladi RT, Li Y, et al. Reaching and treating Spanish-speaking smokers through the National Cancer Institute's Cancer Information Service. A randomized controlled trial. *Cancer*. 2007;109(2 Suppl):406-13.

Ejemplar localizado en: BMN

Wu P, Wilson K, Dimoulas P, Mills EJ. Effectiveness of smoking cessation therapies: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 14 Mar 2007];6:[Aprox. 41 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17156479>

CONTAMINACION POR HUMO DE TABACO /prevención y control

Burton A. Bans, bans, good for the heart!. *Environ Health Perspect* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2006]; 114(3): [Aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16528835>

Barnes RL, Hammond SK, Glantz SA The tobacco industry's role in the 16 Cities Study of second hand tobacco smoke: do the data support the stated conclusions?. *Environ Health Perspect* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007].;

114(12):[Aprox. 38 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17185281>

Bauer JE, Hyland A, Li Q, Steger C, Cummings KM. A longitudinal assessment of the impact of smoke-free worksite policies on tobacco use. *Am J Public Health*. 2005;95(6):1024-9.

Ejemplar localizado en: BMN

Bryan-Jones K, Chapman S. Political dynamics promoting the incremental regulation of secondhand smoke: a case study of New South Wales, Australia. *BMC Public Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];6:[Aprox. 39 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16859560>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). State-specific prevalence of current cigarette smoking among adults and secondhand smoke rules and policies in homes and workplaces--United States, 2005. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007]; 55(42):[Aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5542a2.htm>

Eisner MD. Banning smoking in public places: time to clear the air. *JAMA*. 2006; 296(14):1778-9.

Ejemplar localizado en: BMN

Finkelstein JB. Surgeon General's report heralds turning tide against tobacco, smoking. *J Natl Cancer Inst*. 2006;98(19):1360-2.

Ejemplar localizado en: INOR

Glantz FK, Glantz SA . Protecting Europeans from secondhand smoke: time to act. *Eur Heart J* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2006];27(4): [Aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/27/4/382>

Gonzales M, Malcoe LH, Kegler MC, Espinoza J. Prevalence and predictors of home and automobile smoking bans and child environmental tobacco smoke exposure: a cross-sectional study of U.S.- and Mexico-born Hispanic women with young children. *BMC Public Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];6[Aprox. 35 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17069652>

Hill TD, Wise GR, Wilson TN, Berkel HJ. A blueprint for assessing public support of citywide smoke-free legislation. *Health Promot Pract*. 2006;7(2):243-51.

Ejemplar localizado en: BMN

Ireland's smoking ban is an admirable achievement. *Lancet*. 2005;365(9467):1282.

Ejemplar localizado en: BMN

Kayaba K, Wakabayashi C, Kunisawa N, Shinmura H, Yanagawa H. Implementation of a smoke-free policy on school premises and tobacco control as a priority among municipal health promotion activities: nationwide survey in Japan. *Am J Public Health* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];95(3):[Aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15727969>

Klennert MD, Liu AH, Pearson MR, Ellison MC, Budhiraja N, Robinson JL. Short-term impact of a randomized multifaceted intervention for wheezing infants in low-income families. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2005;159(1):75-82.

Ejemplar localizado en: BMN, INHEM

Kuehn BM. Report reviews second hand smoke risks: some scientists question risk level. *JAMA.* 2006;296(8):922-3.

Ejemplar localizado en: BMN

Leavell NR, Muggli ME, Hurt RD, Repace J. Blowing smoke: British American Tobacco's air filtration scheme. *BMJ.* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2006];332(7535):[Aprox. 16 p.]. Disponible en: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/332/7535/227>

McMullen KM, Brownson RC, Luke D, Chiqui J. Strength of clean indoor air laws and smoking related outcomes in the USA. *Tob Control* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];14(1):[Aprox. 26 p.]. Disponible en: <http://tc.bmj.com/cgi/content/full/14/1/43>

Menzies D, Nair A, Williamson PA, Schembri S, Al-Khairalla MZ, Barnes M, et al. Respiratory symptoms, pulmonary function, and markers of inflammation among bar workers before and after a legislative ban on smoking in public places. *JAMA.* 2006;296(14):1742-8.

Ejemplar localizado en: BMN

O'Dowd A. Related Articles, Links Total smoking ban best way to narrow health gap between rich and poor, MPs told. *BMJ* [Serie en Internet] 2005 [citado 15

Mar 2007];331(7523):[Aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/331/7523/985-a>

Pan J, Barbeau EM, Levenstein C, Balbach ED. Related Articles, Links Smoke-free airlines and the role of organized labor: a case study. *Am J Public Health* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];95(3):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15727966>

Repape JL, Hyde JN, Brugge D. Related Articles, Links Air pollution in Boston bars before and after a smoking ban. *BMC Public Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];6:[Aprox. 37 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17069654>

Reynolds JH, Hobart RL, Ayala P, Eischen MH. Clean indoor air in El Paso, Texas: a case study. *Prev Chronic Dis* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];2(1):[Aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utills/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=3494&uid=15670475&db=pubmed&url=http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15670475>

Rosenfield D, Manuel DG, Alter DA. The Smoking Regulatory Index: a new way to measure public health performance. *CMAJ.* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];174(10):[Aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/174/10/1403>

Teach SJ, Crain EF, Quint DM, Hyland ML, Joseph JG.

Improved asthma outcomes in a high-morbidity pediatric population: results of an emergency department-based randomized clinical trial. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2006;160(5):535-41.

Ejemplar localizado en: BMN

Thomson G, Wilson N. One year of smokefree bars and restaurants in New Zealand: impacts and responses. *BMC Public Health* [Serie en Internet] 2006 [citado 15 Mar 2007];6:[Aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16533408>

Wilson N. Total smoking ban is accepted in New Zealand. *BMJ* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];12;331(7525):[Aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utills/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=3051&uid=16282423&db=pubmed&url=http://bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16282423>

Wilson SE, Kahn RS, Khoury J, Lanphear BP. Racial differences in exposure to environmental tobacco smoke among children. *Environ Health Perspect.* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];113(3):[Aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15743729>

Yiow L. Australia: campaign gets smoking parents to cut down. *Tob Control.* [Serie en Internet] 2005 [citado 15 Mar 2007];14(6):[Aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://tc.bmj.com/cgi/content/full/14/6/363>

Descriptores utilizados para la recuperación de la información

MeSH

DeCS

SMOKING/prevention and control

TABAQUISMO/prevenición y control

SMOKING/therapy

TABAQUISMO/terapia

TOBACCO USE CESSATION/ methods

CESE DEL USO DE TABACO/métodos

TOBACCO SMOKE POLLUTION
/prevention and control

CONTAMINACION POR HUMO DE
TABACO/prevenición y control

Más información sobre el tema en los siguientes Sitios Web:

Estudio gratis para dejar de fumar por Internet de la Universidad de California. Disponible en: <https://www.stopsmoking.ucsf.edu/index.aspx?src=glatamcansado&gclid=ciirtaxg94ocfqmlvaodfqufqq>

Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Disponible en: http://www.as-sepidemiologia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=2

La SEE da su apoyo a la campaña nacional de prevención del tabaquismo. Todos por la prevención del tabaquismo Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo.

OMS. Tabaquismo: Disponible en: <http://www.who.int/topics/smoking/es/>

En esta página de consulta hallará enlaces hacia descripciones de actividades, informes, noticias y eventos, así como hacia los datos para entrar en contacto con los diversos programas y oficinas de la OMS que se ocupan de tema, y los asociados que colaboran con ellos. Asimismo, figuran enlaces hacia sitios web y temas relacionados.

OMS. Control del Tabaco. Día Mundial Sin Tabaco (DMST). Disponible en:

<http://www.paho.org/spanish/ad/sde/ra/Tabdmst.htm>

Cada año, se escoge un tema específico. Enfocados en ese tema, se preparan actividades y materiales para ese día, para informar al público de los peligros del uso del tabaco, las prácticas de negocio de las compañías tabacaleras, lo que está haciendo la OMS para luchar contra la epidemia del tabaquismo, y qué puede hacer la gente alrededor del mundo para reclamar por sus derechos a la salud y a una vida saludable, así como para proteger a las futuras generaciones.

República Argentina. Ministerio de Salud. Programa Nacional de Control de Tabaco. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/index.asp

Ofrece información sobre el tabaquismo en Argentina, noticias nacionales e internacionales, campaña de promoción y el programa nacional de control del Tabaco.

Asociación Española Contra el Cáncer. Disponible en:

<http://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Cancer/Consejos+de+Salud/Tabaco/>

Globalink Disponible en: <http://www.globalink.org/nbgs>

Recopilación de noticias y novedades de ámbito nacional e internacional, referidas al tabaco, el tabaquismo y su prevención.

CNPT. Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Disponible en: <http://www.cnpt.es/>
Este Sitio pretende colaborar con todos los profesionales, entidades e instituciones implicadas en la prevención y control del tabaquismo en España.

Sedet. Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Disponible en: <http://www.sedet.es/sedet/index.html>

SANAT. Sociedad Andaluza para el Abordaje del Tabaquismo. Disponible en: <http://www.sanat-tabaquismo.com/>

Sitio que ofrece información con Noticias, Artículos, foros, correos y enlaces sobre Tabaquismo.

Agency for Healthcare Research and Quality de los EE. UU. Disponible en:

<http://www.ahrq.gov/path/tobacco.htm>

Ofrece (guías para clínicos sobre métodos y tratamientos para dejar de fumar; guías para el público en general para dejar de fumar).

ASH Scotland- Action on Smoking and Health.. Disponible en:

http://www.ashscotland.org.uk/ash/ash_display_home.jsp;jsessionid=3AE2605705AD149A16D7E34709426716?p_applic=CCC&p_service=Content.show&pContentID=3752&

Organización líder de Escocia en la promoción de legislaciones y políticas para el control del tabaco.

Treatobacco.net. Disponible en: <http://www.treatobacco.net/home/home.cfm>

Página patrocinada por la OMS que ofrece información muy exhaustiva sobre la práctica totalidad de los aspectos implicados en la lucha contra el hábito de fumar, y pensada no sólo para el fumador, sino también para el profesional de la salud o de la educación; permite seleccionar idioma español

Archivos sobre Control del Tabaco de la Biblioteca de la Universidad de California en San Francisco. Disponible en: <http://www.library.ucsf.edu/tobacco/>

.SEPAR. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Tabaquismo. Disponible en:

http://db.separ.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/separ/separ2003.pkg_areas.muestradoc?p_id_menu=17

Sitio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica dedicado al tabaquismo. Ofrece Normativa SEPAR sobre tratamiento del tabaquismo; manual de prevención y tratamiento del tabaquismo; (revista "Prevención del Tabaquismo").

Día Mundial Sin Tabaco 2007

JUEVES 31 DE MAYO

El tema del Día Mundial Sin Tabaco (DMST)

"Ambientes libres de humo de tabaco"

El tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo. Está comprobado que la mitad de las personas que fuman en forma regular hoy – unos 650 millones de personas – eventualmente morirán a causa del tabaco. Igualmente alarmante es el hecho de que cientos de miles de personas que nunca han fumado mueren cada año de enfermedades causadas por la exposición al humo de tabaco ajeno.

