

TRASTORNOS MENTALES

EDITORIAL

*"La salud mental implica la capacidad de un individuo para establecer relaciones armónicas con otros y para participar en modificaciones de su ambiente físico y social y de contribuir con ello de modo constructivo."*¹

Generalmente estas enfermedades traen consigo trastornos del conocimiento, que son las alteraciones en el proceso mental relacionadas con el pensamiento, razonamiento y juicio. Ejemplo de esta enfermedad de deterioro es la demencia. El término demencia hace alusión a un trastorno mental orgánico adquirido, con pérdida de la capacidad intelectual que tiene severidad suficiente para interferir con el funcionamiento social u ocupacional. La disfunción es multifacético y conlleva la memoria, conducta, personalidad, juicio, atención, relaciones espaciales, lenguaje, pensamiento abstracto, y otras funciones ejecutivas. La decadencia intelectual es usualmente progresiva, e inicial-

mente se conserva el nivel de conciencia.⁽²⁾ MeSH

La demencia de tipo Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en nuestro entorno. La persistencia del tratamiento es un factor crucial para demorar el deterioro funcional y cognitivo del paciente.³

Dentro de los trastornos mentales se abordan además la Depresión y la esquizofrenia que constituyen en sí una anomalía psico- patológica.

Depresión. Estados depresivos generalmente de intensidad moderada comparados con la depresión mayor presente en los trastornos neuróticos y psicóticos. Esta se representa por estados de ánimo tales como: disminución del disfrute, apatía y pérdida de interés en el trabajo, sentimiento de minusvalía, insomnio, anorexia, etc.

La Esquizofrenia es un trastorno emocional grave de tipo psicótico característicamente marcado por un abandono de la realidad con formación de delirios, alucinaciones, dese-

quilibrio emocional y conducta regresiva. (2)

Teniendo en cuenta que estas alteraciones son lo suficientemente graves como para interferir en las actividades de la vida diaria de estos pacientes donde los síntomas cognitivos han sido los más estudiados, aunque los trastornos conductuales son los que más sobrecarga provocan al cuidador, es por esta razón que esta publicación BIBLIOMED trata de abordar lo referente a las intervenciones terapéuticas (tratamiento) y la rehabilitación para la restauración de la función del individuo.

Existen evidencias de que el tratamiento debe ser individual, interdisciplinario en el que deben implicarse además del paciente, la familia.

La intervención no farmacológica deberá dirigirse a la dificultad de adaptación del enfermo al ambiente que lo rodea y a la dinámica familiar, mientras que la farmacológica tenderá a reducir el impacto de la disfunción de

los circuitos frontosubcorticales.(4)

La salud cada día se hace más integral, y tiene dentro de sus conceptos importantes el bienestar biopsicosocial. Los trastornos mentales, muchas veces se inician en edades que interfieren en la educación y el empleo, dañando por completo el futuro de las personas con este padecimiento. Debido a esta razón el MINSAP realiza grandes esfuerzos por mantener la calidad de vida de estos pacientes con una atención especializada en los Centros de Salud Mental distribuidos por municipios y en los hospitales especializados y generales en caso de necesitar un tipo de atención mayor.

DIRECTORA

Bárbara Lazo Rodríguez

EDITORA

Margarita Pobeá Reyes

COMPILACIÓN

Ana Luisa Pinillo León

CONFECCIÓN Y DISEÑO

Mercedes Martínez Martos

Publicación bimestral, contiene informaciones bibliográficas de documentos que se encuentran en la Biblioteca Médica Nacional y sus temas responden a las líneas de investigación priorizadas del Ministerio de Salud Pública, es editado por el área de Servicios Bibliotecarios y está disponible en su sitio web por la Red Electrónica de Salud.

©1994-2006

*Biblioteca Médica Nacional
Dirección: 23 esq. N. Vedado,
La Habana. Cuba.*

Teléfono: (537) 8324317

Email: mpobeá@infomed.sld.cu

Se espera que la información bibliográfica que se brinda sobre esta temática, sea de utilidad y satisfaga sus necesidades informativas.

Lic. Ana Luisa Pinillo

Referencias Bibliográficas:

1. Rodríguez Miranda O, Apolinaire Pennini JJ, Alonso Alomá I. Prevalencia de alteraciones de la salud mental y factores de riesgo relevantes. Rev Cubana Med Gen Integr [Serie en Internet]. 2003[citada el 20 de octubre 2006];19(4): [Aprox. 18 pantallas] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000400007&lng=es&nrm=iso
2. National Library of Medicine. MeSH Database. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh> [Consultado: 8 de Noviembre del 2006].
3. Senties-Madrid H, Estanol-Vidal B. [Demencias reversibles y demencias tratables]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];43(2):[Aprox. 12 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMed>

[Line.asp?Refer=2003249&Revista=RevNe](http://www.revneurol.com/LinkOut/formMed)

4. Sicras Mainar A, Vergara J, León Colombo T, Febrer L, Rejas Gutierrez J. Análisis comparativo de los patrones de persistencia de medicaciones antidemencia en una cohorte retrospectiva de pacientes con demencia de tipo Alzheimer tratados con donepecilo, rivastigmina, galantamina y memantina en España. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];43(8):[Aprox. 8 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/url.asp?url=VeureResum.asp?aof=19754275516476609103&Par1=ind.asp&Par2=43&Par3=08&P=11049>

TRASTORNOS MENTALES

Alvarado MFP, Ormeño CLP, Martínez HLE. Medición del nivel de detección de ansiedad, depresión y delirium en las unidades de terapia intensiva y cuidados intensivos. Acta Med Gpo Ang [Serie en Internet] 2003 [citada el 20 de octubre 2006];1(2):[Aprox. 2 p]. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-actmed/e-am2003/e-am03-2/e-am032e.htm> revista Actamedica Grupo angeles

Birkmann JC, Sperduto JC, Smith RC, Gill KJ. A collaborative rehabilitation approach to the

improvement of inpatient treatment for persons with a psychiatric disability. *Psychiatr Rehabil J* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];29(3):[Aprox. 10 p]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=30&hid=103&sid=74e8bcdd-1e4c-4889-8ea9-226707b100be%40sessionmgr102>

Gagnon J, Bouchard MA, Rainville C. Differential diagnosis between borderline personality disorder and organic personality disorder following traumatic brain injury. *Bull Menninger Clin* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];70(1):[Aprox.29 pantallas]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=103&sid=74e8bcdd-1e4c-4889-8ea9-226707b100be%40sessionmgr102>

Hand C, Tryssenaar J. Small business employers' views on hiring individuals with mental illness. *Psychiatr Rehabil J* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006] Winter;29(3):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=27&hid=3&sid=74e8bcdd-1e4c-4889-8ea9-226707b100be%40sessionmgr102>

Heinze G, González Olivera J. Introducción. El papel de los procedimientos neuroquirúrgicos en padecimientos mentales. *Salud Mental* 2006; 29(1):1-2

Larivière N, Gelinas I, Mazer B, Tallant B, Paquette I. Adjustment to community residential settings over time among older adults with serious mental illnesses. *Psychiatr Rehabil J* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre

2006] Winter;29(3):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=21&hid=103&sid=74e8bcdd-1e4c-4889-8ea9-226707b100be%40sessionmgr102>

Loa N, Chávez RA, Lara M. La creatividad y el relato en los diferentes tipos de delirios crónicos: un estudio descriptivo. *Salud Mental* 2005;28(4): 10-7

Organización Panamericana de la Salud. Atención Comunitaria a personas con trastornos psicóticos. Washington DC: OPS, 2005. 152 p. (Publicación Científica 601)

Rodríguez Méndez O. Salud Mental infante juvenil. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 2005. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/salud_mentalinfantejuvenil/completo.pdf

Rodríguez Miranda O, Apolinaire Pennini JJ, Alonso Alomá I. Prevalencia de alteraciones de la salud mental y factores de riesgo relevantes. *Rev Cubana Med Gen Integr* [Serie en Internet] 2003 [citada el 20 de octubre 2006];19(4):[Aprox.18 pantallas]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000400007&lng=es&nrm=iso

Roe D. Clients' feelings during termination of psychodynamically oriented psychotherapy. includes abstract). *Bulletin of The Menninger Clinic Bull Menninger Clin* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];70(1):[Aprox.15 pantallas]. Disponible en: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=17&hid=103&sid=74e8bcdd-1e4c-4889-8ea9-226707b100be%40sessionmgr102>

Sotolongo García Y, Menéndez López JR, Valdés Mier MÁ, Campos Zamora M, Turró Mármol CM. Psiquiatría de enlace en el paradigma salubrista: reto o salto cualitativo. *Rev Cub Med Mil* [Serie en Internet] 2004 [citada el 20 de octubre 2006];33(1): [Aprox 16 pantallas] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572004000100008&lng=es&nrm=iso

Tiemi Murofose N, Palucci Marziale MH. Trastornos mentales y de comportamiento en trabajadores de enfermería 23 instituciones de salud en Brasil. *Rev Enfermer IMSS* 2005;13(3):133-40

TRASTORNOS MENTALES/ CONOCIMIENTO

Abbatecola AM, Rizzo MR, Barbieri M, Grella R, Arciello A, Laieta MT, et al. Postprandial plasma glucose excursions and cognitive functioning in aged type 2 diabetics. *Neurology* 2006;Jul 25;67(2):235-40.

Ejemplar localizado en: CIREN

Alhola P, Polo-Kantola P, Erkkola R, Portin R. Estrogen therapy and cognition: a 6-year single-blind follow-up study in postmenopausal women. *Neurology*. 2006;67(4):706-9.

Ejemplar localizado en: CIREN

Blekher T, Johnson SA, Marshall J, White K, Hui S, Weaver M, et al. Saccades in presymptomatic and early stages of Huntington disease. *Neurology* 2006;67(3): 394-9.

Ejemplar localizado en: CIREN

Boyle PA, Wilson RS, Aggarwal NT, Tang Y, Bennett DA, et al. Mild cognitive impairment:

risk of Alzheimer disease and rate of cognitive decline. *Neurology*. 2006;67(3):441-5.

Ejemplar localizado en: CIREN

Bozzali M, Filippi M, Magnani G, Cercignani M, Franceschi M, Schiatti E, et al. The contribution of voxel-based morphometry in staging patients with mild cognitive impairment. *Neurology* 2006;67(3):453-60

Ejemplar localizado en: CIREN

Casanova Sotolongo P, Casanova Carrillo P, Casanova Carrillo C. Deterioro cognitivo en la tercera edad. *Rev Cubana Med Gen Integral [Serie en Internet]* 2004 [citada el 20 de octubre 2006];20(5-6):[Aprox. 17 pantallas]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_5-6_04/mgi125_604.htm

Chilovi BV, Rozzini L, Padovani A. Parkinsonian signs in subjects with mild cognitive impairment. *Neurology* 2006;67(1): 182-3

Ejemplar localizado en: CIREN

Meltzer CC, Bell Mc-Ginty S, Scanlon JM. Exploración del deterioro cognitivo leve por neuroimagen. *Rev Neurol [Serie en Internet]* 2003[citada el 20 de octubre 2006];37(2): [Aprox.5 pantalla]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/url.asp?url=VeureResum.asp?aof=19754275516476609103&Par1=ind.asp&Par2=43&Par3=08&P=11049>

Donati F, Gobbi G, Campistol J, Rapatz G, Daehler M, Sturm Y, et al. Effects of oxcarbazepine on cognitive function in children and adolescents with partial seizures. *Neurology* 2006;67(4):679-82.

Ejemplar localizado en: CIREN

Dobato JL. Visual naming and semiology in cognitive impairment]. *Rev Neurol* 2006; 42(10):577.

Ejemplar localizado en: CIREN

Elkins JS, Longstreth WT Jr, Manolio TA, Newman AB, Bhadelia RA, Johnston SC, et al. Education and the cognitive decline associated with MRI-defined brain infarct. *Neurology* 2006;67(3):435-40.

Ejemplar localizado en: CIREN

Eussen SJ, de Groot LC, Joosten LW, Bloo RJ, Clarke R, Ueland PM, et al. Effect of oral vitamin B-12 with or without folic acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: a randomized, placebo-controlled trial. *Am J Clin Nutr* 2006; 84(2):361-70.

Ejemplar localizado en: BMN

Fernández Cherkásova L, Díaz Zayas N, Guevara Rodríguez IM. Estudio de factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular en el Policlínico Docente "Doctor Carlos J. Finlay". *Rev Cubana Med Gen Integr [Serie en Internet]* 2004 [citada el 20 de octubre 2006]; 20(1):[Aprox. 15 pantallas]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_1_04/mgi05104.htm

Fernández Turrado T, Tejero Juste C, Santos Lasasosa S, Pérez L, Piñol Ripoll G, Mostacero Miguel E, et al. Lenguaje y deterioro cognitivo: un estudio semiológico en denominación visual. *Rev Neurol [Serie en Internet]* 2006 [citada el 20 de octubre 2006];42(10):[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/url.asp?url=VeureResum.asp?aof=19754275516476609103&Par1=ind.asp&Par2=43&Par3=08&P=11049>

[ind.asp&Par2=43&Par3=08&P=11049](http://www.revneurol.com/ind.asp&Par2=43&Par3=08&P=11049)

Henley SM, Frost C, McManus DG, Warner TT, Fox NC, Tabrizi SJ. Increased rate of whole-brain atrophy over 6 months in early disease. *Huntington. Neurology* 2006;67(4):694-6.

Ejemplar localizado en: CIREN

DEMENCIA/terapia

Alberdi-Leniz A. [Antipsicóticos atípicos en pacientes ancianos con demencia: la polémica continúa]. *Aten Primaria [Serie en Internet]* 2006 [citada el 20 de octubre 2006];37(6): [Aprox. 12 pantallas] Disponible en: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZI0105&rev=27&vol=37&num=6&pag=

Andersson LM, Hagberg L, Rosengren L, Fuchs D, Blennow K, Gisslen M. Normalisation of cerebrospinal fluid biomarkers parallels improvement of neurological symptoms following HAART in HIV dementia--case report. *BMC Infect Dis [Serie en Internet]* 2006 [citada el 20 de octubre 2006];6:[Aprox. 5 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1578577&blobtype=pdf>

Fossey J, Ballard C, Juszczak E, James I, Alder N, Jacoby R, et al. Effect of enhanced psychosocial care on antipsychotic use in nursing home residents with severe dementia: cluster randomised trial. *BMJ [Serie en Internet]* 2006 [citada el 20 de octubre 2006]; 2006 Apr 1;332(7544): [Aprox.4 pantallas]. Disponible en: http://bmj.bmjournals.com/cgi/reprint_abr/332/7544/756

- Gandia L, Álvarez RM, Hernández-Guijo JM, González-Rubio JM, de Pascual R, Rojo J, et al. [Anticolinesterásicos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];42(8): [Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005227&Revista=RevNeuro>
- García-Ruiz Espiga PJ, Echeverría A, García-Torres A, Contreras A. [Nuevas opciones terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];42(8): [Aprox.4 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005218&Revista=RevNeuro>
- Gauthier S, Herrmann N, Ferreri F, Agbokou C. Use of memantine to treat Alzheimer's disease. *CMAJ* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];175(5):[Aprox. 2 pantallas] Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/175/5/501>
- Grau-Veciana JM. [Tratamiento de los síntomas no cognitivos de la enfermedad de Alzheimer]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];2006 Apr 16-30;42(8): [Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005217&Revista=RevNeuro>
- Hitzeman N. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. *Am Fam Physician* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];74(5):[Aprox. 14 pantallas]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/20060901/cochrane.html#c1>
- Jones SS. Are atypical antipsychotics safe in patients with Alzheimer's disease?. *Am Fam Physician* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];74(3):[Aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/20060801/cochrane.html#c3>
- Kaduszkiewicz H. An innovative approach to involve patients in measuring treatment effects in drug trials. *CMAJ* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];174(8):[Aprox.2 pantallas]. Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/174/8/1117>
- Light SA, Holroyd S. The use of medroxyprogesterone acetate for the treatment of sexually inappropriate behaviour in patients with dementia. *J Psychiatry Neurosci* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];31(2):[Aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/NO/12/jpn/vol-31/issue-2/pdf/pg132.pdf>
- Maggini M, Vanacore N, Raschetti R. Cholinesterase inhibitors: drugs looking for a disease?. *PLoS Med* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];3(4):[Aprox.5 pantallas] Disponible en: http://medicine.plosjournals.org/archive/1549-1676/3/4/pdf/10.1371_journal.pmed.0030140-S.pdf
- Omelan C. Approach to managing behavioural disturbances in dementia. *Can Fam Physician* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];52: [Aprox 9 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1479717&blobtype=pdf>
- Riu-Subirana S, Rodríguez-Cubas JL. Que hay de nuevo sobre demencia?. *Aten Primaria* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];37(1): [Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.pubmed_full?inctrl=05ZI0105&rev=27&vol=37&num=1&pag=3
- Robles-Bayon A. [Acción de la memantina sobre la alteración cognitiva del paciente con demencia: reflexiones tras dos años de experiencia en España]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];42(5):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005336&Revista=RevNeuro>
- Rockwood K, Fay S, Song X, MacKnight C, Gorman M. Video-Imaging Synthesis of Treating Alzheimer's Disease (VISTA) Investigators. Attainment of treatment goals by people with Alzheimer's disease receiving galantamine: a randomized controlled trial. *CMAJ* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];174(8):[Aprox.7 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=142147&blobtype=pdf>
- Scalco MZ, van Reekum R. Prevention of Alzheimer disease. Encouraging evidence. *Can Fam Physician* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];52:[Aprox. 8 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1479722&blobtype=pdf>
- Senties-Madrid H, Estanol-Vidal B. [Demencias reversibles y demencias tratables]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];43(2):[Aprox. 12

pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurolog.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2003249&Revista=RevNeurolog>

Tanovic A, Alfaro V. [Neuroprotección con memantina (antagonista no competitivo del receptor NMDA-glutamato) frente a la excitotoxicidad asociada al glutamato en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia vascular]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];42(10):[Aprox. 10 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurolog.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005252&Revista=RevNeurolog>

Thavichachart N, Phanthumchinda K, Chankrachang S, Praditsawan R, Nidhinandana S, Senanarong V, et al. Efficacy study of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease and vascular dementia in Thai patients: a slow-titration regimen. *Int J Clin Pract* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006]; 60(5):[Aprox. 8 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1473179&blobtype=pdf>

Usui T. Pharmaceutical prospects of phytoestrogens. *Endocr J* [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];53(1): [Aprox.14 pantallas]. Disponible en: http://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/53/1/7/_pdf

Zhao L, Brinton RD. Select estrogens within the complex formulation of conjugated equine estrogens (Premarin) are protective against neurodegenerative insults: implications for a composition of estrogen therapy to promote neuronal function and prevent Alzheimer's disease. *BMC*

Neurosci [Serie en Internet] 2006 [citada el 20 de octubre 2006];7:[Aprox. 13 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1421415&blobtype=pdf>

DEMENCIA/rehabilitación

Abrisqueta-Gómez J, Canali F, Vieira VL, Aguiar AC, Ponce CS, Brucki SM, et al. A longitudinal study of a neuropsychological rehabilitation program in Alzheimer's disease. *Arq Pneuropsiquiatr* [Serie en Internet] 2004 [citada el 20 de octubre 2006];62(3B): [Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/anp/v62n3b/a07v623b.pdf>

Avila R, Bottino CM, Carvalho IA, Santos CB, Seral C, Miotto EC. Neuropsychological rehabilitation of memory deficits and activities of daily living in patients with Alzheimer's disease: a pilot study. *Braz J Med Biol Res* [Serie en Internet] 2004 [citada el 20 de octubre 2006];37(11):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/bjmb/v37n11/5399.pdf>

Shaw FE, Bond J, Richardson DA, Dawson P, Steen IN, McKeith IG, Kenny RA. Multifactorial intervention after a fall in older people with cognitive impairment and dementia presenting to the accident and emergency department: randomised controlled trial. *BMJ* [Serie en Internet] 2003 [citada el 20 de octubre 2006];326(7380): [Aprox.6 pantallas]. Disponible en: <http://bmj.bmjournals.com/cgi/reprint/abr/326/7380/73>

Toulotte C, Fabre C, Dangremont B, Lensele G, Thevenon A. Effects of physical training on the physical capacity of frail,

demented patients with a history of falling: a randomised controlled trial. *Age Ageing* [Serie en Internet] 2003 [citada el 20 de octubre 2006];32(1): [Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/reprint/32>

DEPRESIÓN/terapia

Antunes HK, Stella SG, Santos RF, Bueno OF, de Mello MT. Depression, anxiety and quality of life scores in seniors after an endurance exercise program. *Rev Bras Psiquiatr* [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];27(4):[Aprox.6 pantallas]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v27n4/a03v27n4.pdf>

Blier P. Psychopharmacology for the clinician. Treating depression with selective norepinephrine reuptake inhibitors. *J Psychiatry Neurosci* [Serie en Internet] 2006 [citada el 13 de Octubre 2006];31(4):[Aprox. 1 pantallas]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/12/jpn/vol-31/issue-4/pdf/pg288.pdf>

Bondolfi G, Aubry JM, Golaz J, Gex-Fabry M, Gervasoni N, Bertschy G. A stepwise drug treatment algorithm to obtain complete remission in depression: a Geneva study. *Swiss Med Wkly* [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];136(5-6): [Aprox.9 pantallas]. Disponible en: http://www.smw.ch/dfe/set_arc_hiv.asp?target=2006/05/smw-11267

Carod-Artal FJ. [Depresión postictus (II). Diagnostico diferencial, complicaciones y tratamiento]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];42(4): [Aprox. 7 pantallas]. Disponible en:

<http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005142&Revista=RevNeurol>

Ell K. Depression care for the elderly: reducing barriers to evidence-based practice. Home Health Care Serv Q [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];25(1-2):[Aprox. 25 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16842629>

Ernst C, Olson AK, Pinel JP, Lam RW, Christie BR. Antidepressant effects of exercise: evidence for an adult-neurogenesis hypothesis?. J Psychiatry Neurosci [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];31(2):[Aprox.9 pantallas]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/12/jpn/vol-31/issue-2/pdf/pg84.pdf>

Fregni F, Pascual-Leone A. Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of depression. J Psychiatry Neurosci [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006] 2005 Nov;30(6):[Aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/staticContent/HTML/N0/12/jpn/vol-30/issue6/pdf/pg434.pdf>

Gunn J, Diggins J, Hegarty K, Blashki G. A systematic review of complex system interventions designed to increase recovery from depression in primary care. BMC Health Serv Res [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];6:[Aprox. 25 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16842629>

Gostautas A, Pranckeviciene A, Matoniene V. Changes in depression and quality of life during inpatient treatment of

depression. Medicina (Kaunas) [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];42(6): [Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://medicina.kmu.lt/0606/06-06-05e.pdf>

Groot M, de Pinkerman B, Wagner J, Hockman E. Depression treatment and satisfaction in a multicultural sample of type 1 and type 2 diabetic patients. Diabetes Care [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];29(3):[Aprox.5 pantallas]. Disponible en: <http://care.diabetesjournals.org/cgi/reprint/29/3/549>

Nowak G, Szewczyk B, Pilc A. Zinc and depression. An update. Pharmacol Rep [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];57(6): [Aprox.6 pantallas]. Disponible en: http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2005/6_713.pdf

Rupke SJ, Blecke D, Renfrow M. Cognitive therapy for depression. Am Fam Physician [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];73(1): [Aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/2006/101/83.pdf>

Saxena S, Bertolote JM. Co-occurring depression & physical disorders: need for an adequate response from the health care system. Indian J Med Res [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];122(4):[Aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <http://www.icmr.nic.in/ijmr/2005/october/editorial1.pdf>

Schacht TE. Making psychotherapy work in primary care medicine. Am Fam Physician [Serie en Internet] 2006 [citada el 16 de Octubre 2006];73(1):[Aprox. 13 pantallas]. Disponible en:

<http://www.aafp.org/afp/2006/101/editorials.html#e1>

Schechter LE, Ring RH, Beyer CE, Hughes ZA, Khawaja X, Malberg JE, et al. Innovative approaches for the development of antidepressant drugs: current and future strategies. Neuro Rx [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];2(4):[Aprox. 22 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1201318&blobtype=pdf>

Spencer DC, Nashelsky J. Counseling or antidepressants for treating depression?. Am Fam Physician [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];72(11):[Aprox.6 pantallas] Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/2005/1201/fpin.html>

DEPRESION / rehabilitación

Gunn J, Diggins J, Hegarty K, Blashki G. A systematic review of complex system interventions designed to increase recovery from depression in primary care. BMC Health Serv Res [Serie en Internet] 2005 [citada el 16 de Octubre 2006];6:[Aprox.11 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1559684&blobtype=pdf>

Means KM, O'Sullivan PS, Rodell DE. Psychosocial effects of an exercise program in older persons who fall. J Rehabil Res Dev [Serie en Internet] 2003 [citada el 16 de Octubre 2006];40(1):[Aprox.29 pantallas]. Disponible en: <http://www.vard.org/jour/03/40/1/Means.html>

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER/terapia

Hitzeman N. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's

- disease. Am Fam Physician [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];1;74(5): [Aprox. 15 pantallas]. Disponible en: <http://www.aafp.org/afp/2006/0901/cochrane.html#c1>
- Gandia L, Álvarez RM, Hernández-Guijo JM, González-Rubio JM, de Pascual R, Rojo J, Tapia L. [Anticolinesterasicos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];42(8): [Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005227&Revista=RevNeurol>
- García-Ruiz Espiga PJ, Echeverría A, García-Torres A, Contreras A. [Nuevas opciones terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];42(8): [Aprox. 4 pantallas] Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005227&Revista=RevNeurol>
- Grau-Veciana JM. [Tratamiento de los síntomas no cognitivos de la enfermedad de Alzheimer]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];42(8):[Aprox. 7 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005227&Revista=RevNeurolhttp://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005217&Revista=RevNeurol>
- Jacobsen JS, Reinhart P, Pangalos MN. Current concepts in therapeutic strategies targeting cognitive decline and disease modification in Alzheimer's disease. NeuroRx [Serie en Internet] 2005 [citada el 23 de octubre 2006];4:[Aprox.15 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1201319&blobtype=pdf>
- Maggini M, Vanacore N, Raschetti R. Cholinesterase inhibitors: drugs looking for a disease?. PLoS Med [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];3(4):[Aprox.5 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16597173>
- Tanovic A, Alfaro V. [Neuroproteccion con memantina (antagonista no competitivo del receptor NMDA-glutamato) frente a la excitotoxicidad asociada al glutamato en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia vascular]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006]; 16-31;42(10):[Aprox. 10 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005252&Revista=RevNeurol>
- Thavichachart N, Phanthumchinda K, Chankrachang S, Praditsuwana R, Nidhinandana S, Senanarong V, Pongvarin N. Efficacy study of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease and vascular dementia in Thai patients: a slow-titration regimen. Int J Clin Pract [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006]; 60(5):[Aprox. 8 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1473179&blobtype=pdf>
- Rockwood K, Fay S, Song X, MacKnight C, Gorman M. Video-Imaging Synthesis of Treating Alzheimer's Disease (VISTA) Investigators. Attainment of treatment goals by people with Alzheimer's disease receiving galantamine: a randomized controlled trial. CMAJ [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006]; 174(8):[Aprox. 7 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1421447&blobtype=pdf>
- Kaduszkiewicz H. An innovative approach to involve patients in measuring treatment effects in drug trials. CMAJ [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];174(8):[Aprox.2 pantallas]. Disponible en: <http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/174/8/1117>
- Robles-Bayon A. [Acción de la memantina sobre la alteración cognitiva del paciente con demencia: reflexiones tras dos años de experiencia en España]. Rev Neurol [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];42(5):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2005336&Revista=RevNeurol>
- Scalco MZ, van Reekum R. Prevention of Alzheimer disease. Encouraging evidence. Can Fam Physician [Serie en Internet] 2006 [citada el 23 de octubre 2006];52:[Aprox.8 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1479722&blobtype=pdf>

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER/rehabilitation

- Ávila R, Bottino CM, Carvalho IA, Santos CB, Seral C, Miotto EC. Neuropsychological rehabilitation of memory deficits and activities of daily living in patients with Alzheimer's disease: a pilot study. Braz J Med Biol Res [Serie en Internet] 2004 [citada el 23 de octubre 2006];37(11):[Aprox. pantallas]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010087

[9X2004001100018&lng=en&nrm=iso&tlngr=en](http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1402287&blobtype=pdf)

Abrisqueta-Gómez J, Canali F, Vieira VL, Aguiar AC, Ponce CS, Brucki SM, et al. A longitudinal study of a neuropsychological rehabilitation program in Alzheimer's disease. *Arq Neuropsiquiatr*. [Serie en Internet] 2004 [citada el 23 de octubre 2006];62(3B): [Aprox.9 pantallas] Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/bjnbr/v37n11/5399.pdf>

ESQUIZOFRENIA/terapia

Adams CE, Rathbone J, Thornley B, Clarke M, Borrill J, Wahlbeck K, et al. Chlorpromazine for schizophrenia: a Cochrane systematic review of 50 years of randomised controlled trials. *BMC Med* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];3: [Aprox. 7 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1274318&blobtype=pdf>

Ascher-Svanum H, Stensland M, Zhao Z, Kinon BJ. Acute weight gain, gender, and therapeutic response to antipsychotics in the treatment of patients with schizophrenia. *BMC Psychiatry*. 2005 Jan 13;5(1):[Aprox.13 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=547901&blobtype=pdf>

Ascher-Svanum H, Zhu B, Faries D, Landbloom R, Swartz M, Swanson J. Time to discontinuation of atypical versus typical antipsychotics in the naturalistic treatment of schizophrenia. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2006 [citada el 13 de Octubre 2006];6: [Aprox. 16 pantallas]. Disponible en:

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1402287&blobtype=pdf>

Faries D, Ascher-Svanum H, Zhu B, Correll C, Kane J. Antipsychotic monotherapy and polypharmacy in the naturalistic treatment of schizophrenia with atypical antipsychotics. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];5(1):[Aprox. 11 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1156914&blobtype=pdf>

Herrera-Estrella M, Apiquian R, Fresan A, Sánchez-Torres I. The effects of amisulpride on five dimensions of psychopathology in patients with schizophrenia: a prospective open-label study. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];5(1):[Aprox. 8 pantallas] Disponible en: <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-244X-5-22.pdf>

Janno S, Holi MM, Tuisku K, Wahlbeck K. Validity of Simpson-Angus Scale (SAS) in a naturalistic schizophrenia population. *BMC Neurol* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];5(1):[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=555761&blobtype=pdf>

Lal S, Thavundayil JX, Nair NP, Annable L, Ng Ying Kin NM, Gabriel A, et al. Levomepromazine versus chlorpromazine in treatment-resistant schizophrenia: a double-blind randomized trial. *J Psychiatry Neurosci* [Serie en Internet] 2006 [citada el 13 de Octubre 2006];31(4):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://www.cma.ca/multimedia/>

[staticContent/HTML/N0/12/jpn/vol-31/issue-4/pdf/pg271.pdf](http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1402287&blobtype=pdf)

Lenert LA, Rupnow MF, Elnitsky C. Application of a disease-specific mapping function to estimate utility gains with effective treatment of schizophrenia. *Health Qual Life Outcomes* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];3:[Aprox. 8 pantallas]. Disponible en: <http://www.hqlo.com/content/pdf/1477-7525-3-57.pdf>

Liu-Seifert H, Adams DH, Kinon BJ. Discontinuation of treatment of schizophrenic patients is driven by poor symptom response: a pooled post-hoc analysis of four atypical antipsychotic drugs. *BMC Med* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];3:[Aprox. 10 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1327673&blobtype=pdf>

Marek G, Merchant K. Developing therapeutics for schizophrenia and other psychotic disorders. *NeuroRx* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];2(4):[Aprox. 11 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1201317&blobtype=pdf>

Marshall M, Lockwood A, Lewis S, Fiander M. Essential elements of an early intervention service for psychosis: the opinions of expert clinicians. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];4:[Aprox.7 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=455683&blobtype=pdf>

McIntosh HM, Woolacott NF, Bagnall AM. Assessing harmful effects in systematic

- reviews. *BMC Med Res Methodol* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];4:[Aprox. 6 pantallas] Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=497041&blobtype=pdf>
- Ollendorf DA, Joyce AT, Rucker M. Rate of new-onset diabetes among patients treated with atypical or conventional antipsychotic medications for schizophrenia. *Med Gen Med* [Serie en Internet] 2004[citada el 13 de Octubre 2006] 2004 Jan 20;6(1):[Aprox. 27 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=15208518>
- Petersen L, Jeppesen P, Thorup A, Abel MB, Ohlenschlaeger J, Christensen TO, et al. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. *BMJ* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];331(7517):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://bmj.bmjournals.com/cgi/reprint/331/7517/602>
- Rossi A, Daneluzzo E, Tomassini A, Struglia F, Cavallaro R, Smeraldi E, et al. The effect of verbalization strategy on Wisconsin Card Sorting Test performance in schizophrenic patients receiving classical or atypical antipsychotics. *BMC Psychiatry* [Serie en Internet] 2006 [citada el 13 de Octubre 2006];6:[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1373618&blobtype=pdf>
- Tiihonen J, Wahlbeck K, Lonnqvist J, Klaukka T, Ioannidis JP, Volavka J, et al. Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffective disorder: observational follow-up study. *BMJ* [Serie en Internet] 2006 [citada el 13 de Octubre 2006];333(7561):[Aprox.7 pantallas] Disponible en: <http://bmj.bmjournals.com/cgi/reprint/333/7561/224>
- ESQUIZOFRENIA/
rehabilitation**
- Buchain PC, Vizzotto AD, Henna Neto J, Elkis H. Randomized controlled trial of occupational therapy in patients with treatment-resistant schizophrenia. *Rev Bras Psiquiatr* 2003; 25(1):[Aprox. 5 pantallas] Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v25n1/15150.pdf>
- Chatterjee S, Patel V, Chatterjee A, Weiss HA. Evaluation of a community-based rehabilitation model for chronic schizophrenia in rural India. *Br J Psychiatry* [Serie en Internet] 2003 [citada el 15 de Octubre 2006];182:[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/182/1/57>
- Crosse C. A meaningful day: integrating psychosocial rehabilitation into community treatment of schizophrenia. *Med J Aust* [Serie en Internet] 2003 [citada el 15 de Octubre 2006];178(Suppl):[Aprox. 3 pantallas]. Disponible en: http://www.mja.com.au/public/issues/178_09_050503/cro10496_fm.pdf
- Davis LW, Lysaker PH, Lancaster RS, Bryson GJ, Bell MD. The Indianapolis Vocational Intervention Program: a cognitive behavioral approach to addressing rehabilitation issues in schizophrenia. *J Rehabil Res Dev* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006]; 42(1):[Aprox. 32 pantallas] Disponible en: <http://www.vard.org/jour/05/42/1/Davis.html>
- Harman JS, Manning WG, Lurie N, Christianson JB. Association between interruptions in medicaid coverage and use of inpatient psychiatric services. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2003[citada el 15 de Octubre 2006];54(7):[Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/54/7/999>
- Hodgins S, Muller-Isberner R. Preventing crime by people with schizophrenic disorders: the role of psychiatric services. *Br J Psychiatry* [Serie en Internet] 2004[citada el 13 de Octubre 2006];185:[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/185/3/245>
- Janno S, Holi M, Tuisku K, Wahlbeck K. Prevalence of neuroleptic-induced movement disorders in chronic schizophrenia inpatients. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2004 [citada el 15 de Octubre 2006];161(1):[Aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/161/1/160>
- Jonikas JA, Cook JA, Rosen C, Laris A, Kim JB. A program to reduce use of physical restraint in psychiatric inpatient facilities. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];55(7):[Aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/7/818>
- Kern RS, Liberman RP, Kopelowicz A, Mintz J, Green MF. Applications of errorless learning for improving work performance in persons with

- schizophrenia. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2002 [citada el 15 de Octubre 2006];159(11):[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/159/11/1921>
- Kern RS, Green MF, Mitchell S, Kopelowicz A, Mintz J, Liberman RP. Extensions of errorless learning for social problem-solving deficits in schizophrenia. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2005[citada el 13 de Octubre 2006];162(3):[Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/162/3/513>
- Kimhy D, Harkavy-Friedman JM, Nelson EA. Identifying life stressors of patients with schizophrenia at hospital discharge. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];55(12):[Aprox. 1 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/12/1444-a>
- Kopelowicz A, Liberman RP. Integrating treatment with rehabilitation for persons with major mental illnesses. *Psychiatr Serv*. 2003 Nov; 54(11):[Aprox. 9 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/54/11/1499>
- Lak DC, Tsang HW. Rehab rounds: Cultural adaptation of the basic conversational skills module for a Chinese population. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004[citada el 13 de Octubre 2006];55(9):[Aprox.3 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/9/988>
- +++++
- Lamberti JS, Weisman R, Faden DI. Forensic assertive community treatment: preventing incarceration of adults with severe mental illness. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006]; 55(11):[Aprox.9 pantallas] Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/11/1285>
- Lenroot R, Bustillo JR, Lauriello J, Keith SJ. Integrated treatment of schizophrenia. *Psychiatr Serv*. 2003;54(11):[Aprox.10 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/54/11/1499>
- Liberman RP, Kopelowicz A. Recovery from schizophrenia: a concept in search of research. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2005[citada el 13 de Octubre 2006];56(6):[Aprox.8 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/56/6/735>
- Luchins DJ, Cooper AE, Hanrahan P, Rasinski K. Psychiatrists' attitudes toward involuntary hospitalization. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];55(9):[Aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/9/1058>
- Maier GJ. Bringing grandma home. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];56(4):[Aprox.2 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/56/4/416>
- McGurk SR, Mueser KT, Harvey PD, LaPuglia R, Marder J. Cognitive and symptom predictors of work outcomes for clients with schizophrenia in supported employment. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2003 [citada el 15 de Octubre 2006];54(8):[Aprox.7 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/54/8/1129>
- Meadows GN. Overcoming barriers to reintegration of patients with schizophrenia: developing a best-practice model for discharge from specialist care. *Med J Aust* [Serie en Internet] 2003 [citada el 15 de Octubre 2006];178 (Supl):[Aprox. 10 pantallas]. Disponible en: http://www.mja.com.au/public/issues/178_09_050503/mea10584_fm.pdf
- Medalia A, Richardson R. What predicts a good response to cognitive remediation interventions?. *Schizophr Bull* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];31(4):[Aprox.12 pantallas]. Disponible en: <http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/4/942>
- McGurk SR, Mueser KT, Pascaris A. Cognitive training and supported employment for persons with severe mental illness: one-year results from a randomized controlled trial. *Schizophr Bull* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];31(4):[Aprox.12 pantallas]. Disponible en: <http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/4/898>
- Pallanti S, Quercioli L, Hollander E. Social anxiety in outpatients with schizophrenia: a relevant cause of disability. *Am J Psychiatry*. 2004 Jan;161(1):[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/161/1/160>
- Pillmann F, Marneros A. Longitudinal follow-up in acute and transient psychotic disorders and schizophrenia. *Br J Psychiatry* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];187:[Aprox.2 pantallas] Disponible en:

<http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/187/3/286>

Reger G, Wong-McDonald A, Liberman RP. Psychiatric rehabilitation in a community mental health center. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2003 [citada el 13 de Octubre 2006]; 54(11):[Aprox. 8 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/54/11/1491>

Robinson DG, Woerner MG, McMeniman M, Mendelowitz A, Bilder RM. Symptomatic and functional recovery from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. *Am J Psychiatry* [Serie en Internet] 2004 [citada el 15 de Octubre 2006];161(3):[Aprox. 7 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/161/3/473>

Sajatovic M, Jenkins JH, Strauss ME, Butt ZA, Carpenter E. Gender identity and implications for recovery among men and women with schizophrenia. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];56(1):[Aprox.3 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/56/1/96>

Silverstein SM, Wallace CJ, Schenkel LS. The micro-

module learning tests: work-sample assessments of responsiveness to skills training. *Schizophr Bull* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];31(1):[Aprox. 11 pantallas]. Disponible en: <http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/1/73>

Steinert T, Schmid P. Effect of voluntariness of participation in treatment on short-term outcome of inpatients with schizophrenia. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004 [citada el 13 de Octubre 2006];55(7):[Aprox.6 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/7/786>

Vargas ML. [Posibilidades de rehabilitación neurocognitiva en la esquizofrenia]. *Rev Neurol* [Serie en Internet] 2004 [citada el 15 de Octubre 2006]; 38(5):[Aprox. 10 pantallas]. Disponible en: <http://www.revneurol.com/LinkOut/formMedLine.asp?Refer=2003569&Revista=Revneurol>

Wallace C, Mullen PE, Burgess P. Criminal offending in schizophrenia over a 25-year period marked by deinstitutionalization and increasing prevalence of comorbid substance use disorders. *Am J Psychiatry*

[Serie en Internet] 2004 [citada el 15 de Octubre 2006];161(4):[Aprox. 12 pantallas]. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/161/4/716>

Weiden PJ, Kozma C, Grogg A, Locklear J. Partial compliance and risk of rehospitalization among California Medicaid patients with schizophrenia. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2004[citada el 13 de Octubre 2006];55(8):[Aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/55/8/886>

Weng YZ, Xiang YQ, Liberman RP. Psychiatric rehabilitation in a Chinese psychiatric hospital. *Psychiatr Serv* [Serie en Internet] 2005[citada el 13 de Octubre 2006];56(4):[Aprox. 3 pantallas]. Disponible en: <http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/56/4/401>

Wexler BE, Bell MD. Cognitive remediation and vocational rehabilitation for schizophrenia. *Schizophr Bull* [Serie en Internet] 2005 [citada el 13 de Octubre 2006];31(4):[Aprox. 11 pantallas]. Disponible en: <http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/4/93>

Descriptores MeSH o DeCS utilizados en la localización de información:

DeCS

TRASTORNOS MENTALES

TRASTORNOS DEL CONOCIMIENTO

DEMENCIA / terapia

DEMENCIA / rehabilitación

MeSH

MENTAL DISORDERS

COGNITION DISORDERS

DEMENTIA / therapy

DEMENTIA / rehabilitation

DEPRESIÓN / terapia

DEPRESSION / therapy

DEPRESIÓN / rehabilitación

DEPRESSION / rehabilitation

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER/ terapia

ALZHEIMER´S DISEASES/ therapy

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER/rehabilitación

ALZHEIMER´S DISEASES/rehabilitation

ESQUIZOFRENIA/terapia

SCHIZOPHRENIA/therapy

ESQUIZOFRENIA /rehabilitación

SCHIZOPHRENIA/rehabilitation

