

INFLUENZA Y NEUMONIA

RESERVAS Y OPORTUNIDADES EN LOS ADULTOS MAYORES

Dr. Salvador Tamayo Muñiz

TALLER INTERNACIONAL
“LA SALUD DEL ADULTO MAYOR EN CUBA:
IMPACTO EN LA ESPERANZA DE VIDA”

7 de enero de 2006
Hotel Nacional de Cuba



***“La humanidad se va
acercando a la virtual
eliminación de la
enfemedad infecciosa
como un factor
significativo de la vida
social”***

sir Burnet
(Premio Nobel, 1960)

Factores de riesgo con mayor representación en la carga global de la enfermedad

Factor de Riesgo	% Contribución con la CGM
Malnutrición	15.8%
Calidad de agua	6.7%
Sexo inseguro	3.7%
Alcohol	3.3%
Contaminación ambiental	3.3%
Tabaco	3.1%
Riesgos ocupacionales	2.6%
Hipertensión	1.5%
Inactividad física	1.0%
Drogas ilícitas	0.5%
Polución ambiental domestica	0.4%

Tomado del informe, FORO GLOBAL PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, 2001

Cambios en el orden de importancia del peso de las enfermedades para las diez causas principales en todo el mundo, 1990 a 2020 (marco hipotético de referencia)

Enfermedad o secuelas	Total DALY 2020 (en miles)	Total DALY 1990 (en miles)	Lugar en 1990
1 Enfermedad coronaria isquemia	82,325	82,325	5
2 Depresión unipolar aguda	78.662	50.810	4
3 Accidentes de circulación	71.240	34.317	9
4 Enfermedades cerebro vasculares	61.392	61.392	16
5 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	57.587	29.136	12
6 Infecciones respiratorias inferiores	42.692	112.898	42.692
7 Tuberculosis	42.515	38.426	7
8 Guerras	41.315	20.019	12
9 Enfermedades diarreicas	37.097	99.633	2
10 HIV	36.317	11.172	28


Fuente: El peso global de las enfermedades (Murray y Lopez, 1996b).

MAGNITUD DEL PROBLEMA



Mortalidad por neumonía en diferentes países del mundo según sexo

Tasa mortalidad		
Países	Varones	Mujeres
Brasil (1990)	32.4	23.9
Canadá (1995)	23.2	25.4
Argentina (1992)	21.0	16.5
Cuba (1995)	37.7	28.7
Costa Rica (1994)	16.2	11.2
México (1995)	23.2	19.7
Chile (1994)	41.9	39.1
Inglaterra y Gales (1995)	85.2	127.2
Noruega (1994)	54.7	75.8
Francia (1994)	24.9	26.7
Alemania (1995)	19.0	24.0
Italia (1993)	10.5	11.0
Polonia (1995)	14.5	13.8
Rumania (1995)	45.3	28.1
España (1994)	18.1	15.9
Suecia (1995)	46.0	47.8
Finlandia (1995)	44.4	51.6
Australia (1994)	9.4	10.2
Singapur (1995)	67.0	68.0



Tasas crudas por 100.000 habitantes.
Fuente : World Health Statistics Annual 1996.
OMS 1998,
Categoría diagnóstica 321,
Clasificación Internacional de Enfermedades,
9ª Revisión

Influenza y Neumonía

PROBLEMA DE SALUD EN CUBA

- 4^{ta} causa de muerte / todas las edades.
- Entre 5000 y 6900 fallecidos anualmente.
- 2004: 8,1% el total de fallecidos (26% de incremento en relación al 2003).
- 5^{ta} causa de años de vida perdidos.
- Los mayores de 65 años aportan el 56,4% y dentro de ellos los mayores de 85 años aportan el 53% (1405).


Influenza y Neumonía

PROBLEMA DE SALUD EN CUBA

- 5 millones de consultas (25 – 30% de las consultas externas).
- Alrededor del 30% de las hospitalizaciones.
- Primera causa de mortalidad hospitalaria (de 1447 ingresos en los dos últimos años falleció el 32%, en Cienfuegos).

RESERVAS Y OPORTUNIDADES

TECNOLOGÍA ORGANIZACIONAL




GUIAS CLINICAS

- **Prevención.**
- **Diagnostico precoz.**
- **Severidad (ISN).**
- **Conducta terapéutica.**
- **Prevenir recurrencias y morbilidad asociada.**
- **Adecuada recuperación.**

RESERVAS Y OPORTUNIDADES

TECNOLOGÍA MEDICA



- **Vacunas**
 - Influenza
 - Antineumococica
- **Radiología.**
- **Microbiología.**
- **Antimicrobianos.**
- **Emplazamientos.**
- **Rehabilitación.**



"Goya agradecido, á su amigo Arrieta: por el acierto y esmero con qe le salvo la vida en su aguda y / peligrosa enfermedad, padecida á fines del año 1819, a los setenta y tres años de su edad. Lo pinto en 1820".