

Natuseguridad 7

Como comentamos en la Nota anterior continuaremos informando acerca de cómo se comportó el reporte de sospechas a reacciones adversas de los grupos de riesgo, en este caso el de Geriatría, en los años comprendidos desde 2003-2005. Como pueden observar en la siguiente tabla de las 137 notificaciones recibidas en este período de tiempo, el mayor número de reportes fue notificado a los Fitofármacos, en la tabla se reflejan solamente los Fitofármacos más reportados, seguidos por la Acupuntura y el Termalismo, además de dos reportes respectivamente a los Suplementos nutricionales y los Apifármacos. Es importante señalar que a pesar de ser este un grupo de pacientes que ya por su edad tienen patologías de base y en su mayoría son poli medicados, el mayor resultado causal habla de una probabilidad (41.1%) de ser el fármaco el principal causante de la reacción, no se reportan reacciones graves ni fatales.

Modalidad (N, %) (Indicación)	Edad (años)	Fármacos (No reporte)	Reacciones reportadas	Severidad
ACUPUNTURA (46,33.8%) (Artrosis, asma, bursitis, cefalea, cervicalgia, insomnio, dispepsia, etc.)	60 a 90	Acupuntura (45) Auriculopuntura (1)	Crisis vagal, fatiga, granuloma, hematomas, lipotimia, mal de agujas, sudoración, sangramiento y sepsis.	36 leves 10 moderadas
FITOFARMACOS (80,58.8%) (Artritis, epidermofitosis, insuficiencia venosa, catarro, ira, dermatitis, úlcera maleolar, limitación articular, insuficiencia venosa periférica, etc.)	50 a 93	Ajo (15)	Dermatitis, epigastralgia, náuseas y vómitos.	9 leves 6 moderadas
		Aloe (11)	Enrojecimiento, eritema, irritación faríngea, rash y vómitos.	7 leves 4 moderadas
		Orégano (6)	Epigastralgia, estomacal, mareos, temblores e hipertensión.	6 moderadas
		Imefasma (4)	Epigastralgia, diarreas, rubor y vómitos.	2 leves 2 moderadas
		Naranja a y d (8)	Epigastralgia, rash y diarreas.	6 leves 2 moderadas
TERMALISMO (7,5.1%) (Artrosis, epicondilitis y limitación articular)	62 a 86	Fangoterapia (7)	Eritema y dermatitis.	6 leves 1 moderada
SUPLEMENTO NUTRICIONAL (2,1.4%) (Astenia y adinamia)	60 a 63	PV2 (2)	Opresión torácica y palpitaciones.	2 leves
APIFARMACOS (2, 1.4%) (Giardiasis y EPOC)	64	Propolisina y propóleos (2)	Hipertensión y rash.	1Leve 1 moderada

Colaboradores: Téc Jenny Avila Pérez, Dra Giset Jiménez López, Dra Blanca Estela González Delgado y Dr Mario Hernández Cueto.

No 7