

# TRATAMIENTO FONIATRICO

➤ *Relajación*

➤ *Normalización*

➤ *Entonación*

➤ *Respiratorios*

➤ *Estimulativos*

➤ *Entrenamiento auditivo*



# PROTOCOLO DE ACTUACION ASISTENCIAL

**Historia clínica**

**Colaboración**

**Complementarios**

**TRATAMIENTO**



<i>Indicadores de estructura</i>		<i>Plan%</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo</i>
<b>Recursos humanos</b>	<b>Logopeda y personal auxiliar con entrenamiento específico</b>	>90	>90	81-89	< 80
<b>Recursos materiales</b>	<b>Aseguramiento instrumental y equipos médicos según PA</b>	95	95	90-94	< 90
	<b>Disponer de los medicamentos expuestos en el PA</b>	95	95	90-94	< 90
	<b>Disponer de los recursos para la aplicación de investigaciones</b>	95	95	90-94	< 90
<b>Organizativos</b>	<b>Disponibilidad diseño organizati-vo para aplicar el PA</b>	95	95	90-94	< 90
	<b>Planilla recogida datos del PA</b>	100	100	-	<100
	<b>Base de datos electrónica</b>	100	100	-	<100

<i>Indicadores de proceso</i>	<i>Plan%</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo</i>
<b>% pacientes con disfonía crónica que reciben las recomendaciones terapéuticas a partir de la consulta # 4</b>	>90	>90	80-90	< 80
<b>% pacientes con concurrencia al departamento técnico</b>	>80	>80	60-79	< 60
<b>% pacientes con análisis realizados según lo recomienda el PA</b>	>90	>90	80-90	< 80

<i>Indicadores de Resultados</i>	<i>Plan %</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo</i>
<b>% pacientes con diagnóstico confirmatorio a partir de la consulta # 4</b>	<b>&gt;90</b>	<b>&gt;90</b>	<b>80-90</b>	<b>&lt; 80</b>
<b>% pacientes con mejoría ostensible de parámetros vocales por apreciación clínica y opinión del paciente en los primeros 3 meses</b>	<b>&gt;80</b>	<b>&gt;80</b>	<b>60-79</b>	<b>&lt;86</b>
<b>% pacientes con disfonía espástica que se manifiestan satisfechos de resultados obtenidos después de 6 meses</b>	<b>&gt;80</b>	<b>&gt;80</b>	<b>60-79</b>	<b>&lt; 60</b>
<b>% pacientes con disfonía crónica con mejoría ostensible del componente orgánico laríngeo () desaparición o disminución de tamaño de la lesión () del componente inflamatorio () mejoría de la coloración y () otros en los primeros 6 meses</b>	<b>&gt;80</b>	<b>&gt;90</b>	<b>60-79</b>	<b>&lt; 60</b>