CLINICA CIRA GARCIA

CIRUGIA ESPINAL

Prof. René Rubinos
La Habana, CUBA

The background of the slide is a vibrant blue with a radial pattern of light rays emanating from the center, creating a sense of depth and energy.

TRATAMIENTO
QUIRURGICO DE LOS
TRAUMAS
RAQUIMEDULARES

CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS

HISTORIA

- 1949 NICOLL.
- 1954 LOB
- 1963 HOLDSWORTH.
- 1977 WHITESIDES.
- 1977 LOUIS.
- 1983 Mc AFEE.
- 1984 ROY - CAMILLE.
- 1984 DENIS.
- 1984 ALLEN Y FERGUSON

CLASIFICACION A-O

MECANISMO

COMPRESION

TENSION

TORSION

A

B

C

**LESIONES POR
COMPRESION
ESTALLAMIENTO**

**LESIONES
POR DISRRUPCION
TRANSVERSAL**

**LESIONES POR
ROTACION**

CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS

LESION DEL CUERPO VERTEBRAL
COMPRESION

1

IMPACTACION

2

SPLIT

3

ESTALLAMIENTO

CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS

B

LESION DE ELEMENTOS
ANTERIORES Y POSTERIORES
DISTRACCION

LESION POSTERIOR

1

LIGAMENTARIA

2

OSEA

LESION ANTERIOR

3

A TRAVES DEL DISCO

CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS

LESION DE ELEMENTOS
ANTERIORES Y POSTERIORES
ROTACION

1

TIPO A

2

TIPO B

3

CIZALLANTE

NIVELES DE LESION MAS FRECUENTES

- **CERCANA A LA UNION TORACO-LUMBAR**
- **FRECUENTEMENTE SE INVOLUCRA MAS DE UN SEGMENTO (23 %)**

FRECUENCIA Y DISTRIBUCION

A

- 2/3 DE TODAS LAS LESIONES.
- LESIONES ESTABLES TIPO A EXCEDEN 1/3 DEL TOTAL.
- DECRECEN DE CRANEAL A CAUDAL.

B - C

- 1/3 DEL TOTAL DE LESIONES.

B

- MAS FRECUENTE EN LA UNION TORACOLUMBAR.

C

- MAS FRECUENTE EN LA COLUMNA LUMBAR

CLASIFICACION DE DENIS

LOCALIZACION

COL. ANTERIOR

COL. MEDIA

COL. POSTERIOR

CON O SIN COMPROMISO NEUROLOGICO

TABLA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA INESTABILIDAD TORACOLUMBAR WHITE Y PANJABI

<u>ELEMENTOS</u>	<u>VALOR</u>
● Destrucción elementos ant..	2
● Destrucción elementos post.	2
● Translación lat. > 2.5 mm	2
● Rot. Plano sagital > 5°	2
● Daño medular o cola de caballo	2
● Disrupción costovertebral	1
● Previsión de peligro a la carga	2

Total de 5 o más = INESTABLE

ESCALA DE ASIA: (FRANKEL MODIFICADA)

- Grado A** -Lesión completa de la función motora y sensitiva por debajo de la lesión.
- Grado B** -Lesión incompleta. Ausencia de la función motora pero tiene sensibilidad por debajo del nivel neurológico.
- Tipos: 1.- Sensibilidad superficial tactil conservada.
- 2.- Además conserva la térmico dolorosa.
- Grado C** -Lesión incompleta. Tiene sensibilidad.
- Tiene motilidad, músculos con fuerza menor de 3 (Test de Daniel) por debajo del nivel neurológico.
- Grado D** - Lesión incompleta. Tiene sensibilidad.
- Tiene motilidad, músculos con fuerza igual o mayor que 3 (Test de Daniel) .
- Grado E** -Función motora y sensitiva normal.

INESTABILIDAD CLINICA **CONCEPTO**

Es la pérdida de la capacidad de la columna; expuesta a cargas fisiológicas a mantener una relación intervertebral que impida el subsecuente daño del cordón o las raíces medulares y que adicionalmente permita el desarrollo de una deformidad incapacitante o se produzca dolor por cambios estructurales.

DESCOMPRESION E INSTRUMENTACION ESPINALES

¿QUÉ MEJORIA SE OBTIENE?

**EN LAS LESIONES TORACOLUMBARES
ENTRE UN 20 Y UN 33 % DE LOS CASOS
REPORTAN BENEFICIOS
NEUROLOGICOS AL MENOS EN UN
GRADO DE FRANKEL**

¿QUIÉN DEBE OPERAR?

**UN EQUIPO DE QUIRURGICO CON REAL
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LA
CIRUGIA ESPINAL**

¿CUÁNDO OPERAR?

**LO ANTES POSIBLE; CUANDO LAS
CONDICIONES DEL PACIENTE Y DEL
EQUIPO QUIRURGICO SEAN OPTIMAS.**

¿DÓNDE OPERAR?

**EN UN CENTRO CON LAS CONDICIONES
REQUERIDAS PARA ESTE TIPO DE CIRUGIA**

¿QUÉ ABORDAJE EMPLEAR?

ANTERIOR:

EN LOS CASOS CON PREDOMINIO DE LAS LESIONES DEL CUERPO VERTEBRAL (FRACT. POR COMPRESION "A")

POSTERIOR:

EN AQUELLOS QUE PRIMEN LAS LESIONES DE LOS ELEMENTOS VERTEBRALES POSTERIORES (FRACT. POR TENSION "B")

COMBINADA:

HABITUALMENTE EN LAS LESIONES COMPLEJAS (FRACT. POR TORSION "C")

¿CUÁNDO INICIAR LA REHABILITACION?

**VISTO INTEGRALMENTE DEBE INICIARSE
DESDE SU LLEGADA AL CENTRO
HOSPITALARIO CON LA APLICACIÓN DE LOS
CUIDADOS GENERALES Y EN EL
POSTOPERATORIO INMEDIATO DEL PACIENTE**

**JUSTAMENTE DEBE OBTENERSE
UNA INSTRUMENTACION LO
SUFICIENTEMENTE FIRME COMO
PARA PERMITIR LA MOVILIZACION
INMEDIATA SIN LA NECESIDAD DE
ORTESIS LO CUAL ES UNA
PREMISA INELUDIBLE EN EL
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL
LESIONADO RAQUIMEDULAR**

MUCHAS GRACIAS