

# Título: Síndrome Nefrótico Primario en Pediatría. Un estudio de 20 años

Hospital Pediátrico Universitario de Matanzas “Eliseo Noel Camaño”

Autores: Dr. Oscar A. Montell Hernández;  
Dr. Arturo Vidal Tallet; Dra. Caridad Sánchez Hernández; Dra. Adriana Méndez Dayout




# Material y Método

*Se realizó un estudio aplicado, descriptivo y retrospectivo sobre el comportamiento del Síndrome Nefrótico en el Hospital Pediátrico Universitario de Matanzas, “Eliseo Noel Caamaño”, durante el período comprendido desde el 1ero de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2010. Quedando constituido el universo por 59 pacientes diagnosticados con dicha afección en el servicio de Nefrología de la institución en el período señalado.*


*La muestra que se utilizó coincide con el universo descrito. Para cumplimentar los objetivos se revisaron las historias clínicas del total de los pacientes y el libro de registro de morbilidad lo cual permitió obtener los datos necesarios y poder conocer el comportamiento de las variables.*

*Los datos obtenidos fueron procesados utilizando métodos estadísticos (tasas de incidencia, números absolutos y por cientos), lo que nos permitió obtener nuestros resultados.*


# SN. SU COMPORTAMIENTO POR QUINQUENIOS DE ESTUDIO




# SN. PRIMARIO EDAD DE DEBUT




# SN. SU COMPORTAMIENTO SEGUN EL SEXO




# DISTRIBUCION DE PACIENTES CON SN PRIMARIO SEGUN HISTOLOGIA



# SN. COMPLICACIONES ENCONTRADAS EN NUESTRA SERIE



# SN PRIMARIO. SU DISTRIBUCION SEGUN RESPUESTA INICIAL AL TRATAMIENTO ESTEROIDEO



# Conclusiones

- El quinquenio en que el Sínd. Nefrótico se presentó con mayor frecuencia fue 2000-2004 con 24 pacientes
- El grupo de edad más afectado fue el de 3-5 años con predominio del sexo masculino (61,4 %)
- Al Sínd. Nefrótico Primario por Lesiones Mínimas correspondió el 79,7%.
- Las complicaciones mas frecuentes halladas en nuestra serie correspondieron a las respiratorias, seguidas de las gastroentéricas.
- El 59,3% de los pacientes tuvieron una respuesta inicial al tratamiento esteroideo.