

Aspectos Quirúrgicos de la Transformación de M - H.

Dr. Ramiro Fragas Valdés.



15de Marzo del
2008

Que pretendemos?

Lograr en uno o varios tiempos Qx:

- Falo Estético.
- Escroto Normal.
- Orinar de pie.
- Proteger la sensación erógena.
- Mínimos riesgos de morbi/morbilidad.
- Lograr el coito.

REASIGNACIÓN DE GENITALES

MUJER -HOMBRE

EXISTEN DOS TIPOS DE TÉCNICAS PARA CREAR
UN PENE:

1)FALOPLASTIA POR COLGAJOS
(VARIAS TÉCNICAS)

2)METADOIOPLASTIA (Alargamiento del Clítoris)

FALOPLASTIA POR COLGAJOS:

PENE TAMAÑO NORMAL PERO POCO SENSITIVO Y NO SE ERECTA.

METADOIOIPLASTIA:

MICROPENE CONFORMADO A PARTIR DEL CLÍTORIS.

Cuales seran los vasos receptores?

ARTERIAS

- Arteria femoral
- Art. Epigastrica inferior profunda.
- Art. Ilio-circunfleja.

Tiempo urológico.

Alargamiento Uretral

Vaginectomía

Escrotoplastia.

Nervios receptores?

- Nervio ilioinguinal:
sensación proteccionista
- Nervio clitoridiano dorsal:
sensación erógena

Complicaciones de la cirugía de reasignación de genitales:

SANGRAMIENTO

SEPSIS

DEHISCENCIA DE HERIDA

PERFORACIONES DE

ÓRGANOS CERCANOS

NECROSIS DE COLGAJOS

ESTENOSIS DE NEOURETRA Y

NEOVAGINA

COMPLICACIONES GENERALES DE TODA CIRUGÍA

¿Como Evitar las Complicaciones?

- Con una adecuada selección de los casos por el Equipo Multidisciplinario de la Comisión Nacional de Atención a personas Transexuales.
- Cumpliendo los estándares de cuidado adaptados a nuestra realidad.
- Para ello tenemos un equipo de Cirujanos con formación integral (Urólogos, Cirujanos Estéticos, Proctólogo/as, Ginecóloga, etc.).

CONCLUSIONES.

LA CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN SEXUAL O GENITOPLASTÍA DE ADECUACIÓN GENITAL A PERSONAS TRANSEXUALES, ES COMPLEJA Y REQUIERE DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE VA DESDE EL TRABAJADOR SOCIAL, ESPECIALISTAS DE SALUD MENTAL, JURISTAS, ENDOCRINOLOGOS, CLINICOS, SEXOLOGOS, CIRUJANOS (Urólogos, Cirujanos Plásticos, Proctólogo/as, Ginecóloga).